

Guía de Aves

Reserva Provincial Cultural Natural

Playa Larga



Reserva Provincial Cultural Natural Playa Larga

Se creó el 23 de diciembre de 1997 mediante la Ley Provincial N°384. Es de gran importancia ya que sus costas cuentan la historia del pueblo yagán, el cual habito por más de 5.000 años y hoy representa nuestro origen cultural. Además, la diversidad de ambientes que poseen sus 12 ha. protegen una gran cantidad de avifauna de carácter permanente y migratorio.

Referencias

Tipos de ambientes:

Aire	
Costa	
Pastizal	
Matorral	
Bosque	


Tamaño del Ave:

10cm	
25cm	
40cm	
+50cm	

Residencia:

Permanente (P)

Migratorio (M)



Somos Tomás Spavioli y Valentino Salvo, esta iniciativa surge como parte de nuestro proyecto final de la Tecnicatura Universitaria en Guardaparque; donde se relevó la diversidad de aves que habita en la sierra sorondo incluyendo la Reserva Provincial Cultural Natural Playa Larga, en la cual se llegaron a registrar más de 40 especies.

Desde nuestro aporte con esta guía buscamos poner en valor la riqueza natural de la avifauna y la importancia que representan las ANP para la vida silvestre.

Aporte fotográfico:

-Nicolás Isla

-Federico Muñoz

-Tomás Spavioli



Zorzal Patagónico *Turdus falcklandii* (P)



Pico, ojos y patas amarillas. Cabeza, corona y alas negruzcas. Garganta blanquecina. Dorso grisáceo. Pecho y vientre canela. Ambos sexos similares. Los juveniles presentan tonalidades oscuras.

Chimango *Milvago chimango* (P)



De color marrón, pecho y abdomen con bandas onduladas claras. Alas y cola pardas con tonos blanquecinos. Se lo observa en pequeños grupos por el bosque o realizando vuelos. Ambos sexos son iguales.

Tero *Vanellus chilensis fretensis* (M)



Frente, garganta y pecho negro. Cabeza con plumas negras en la nuca, cuello gris, abdomen blanco y dorso canela. Ojos y patas rojas. Ambos sexos son iguales. Cuando se alarma emite fuertes gritos.

Carancho *Caracara plancus* (P)



Corona, nuca y abdomen color pardo oscuro. Su cuello y pecho son blancos. Posee un pico blanco grueso, con piel rosada sin plumas. Sus patas son color amarillo. Ambos sexos son iguales.

Gaviota Cocinera *Larus dominicanus* (P)



Cabeza y vientre color blanco, alas negras con puntas blancas, patas y pico color amarillo con mancha roja. Los juveniles presentan colores oscuros y grisáceos. Ambos sexos son iguales.

Matamico Blanco *Phalcoboenus albogularis* (P)



Cabeza y dorso negro azulado brillante. Vientre y pecho blanco, Terminación de alas color negro, pico y patas amarillentas, se lo ve solitario o sobrevolando en pareja. Ambos sexos son iguales.

Gaviota Gris *Leucophaeus scoresbii* (P)



Cuerpo color gris. Pico, patas y zona alrededor del ojo rojizo. Alas negruzcas con puntas blancas. Construyen sus nidos con algas, plumas y huesos. Los juveniles presentan una capucha y tonalidades gris oscura. Ambos sexos son iguales.

Águila Mora *Geranoaetus melanoleucus* (P)



Alas anchas de color blanco, gris y negro. Garganta y vientre blancos con estrías oscuras. Pico robusto y ganchudo con patas color amarillo. Juveniles presentan coloración marrón parda. Ambos sexos son iguales.

Comesebo Andino (sp) (P)



Pecho amarillo, alas pardas oscuras, cabeza grisácea. Suele forrajear el suelo en busca de frutos y semillas, de carácter amistoso, en verano se lo ve en pareja. La hembra tiene coloración pálida.

Remolinera Parda *Cinclodes fuscus* (P)




Dorsal parduzco, garganta blanca, ceja clara, cola larga, pecho y vientre gris. Es observada en la reserva únicamente en verano, anida en huecos y barrancas.

Cachudito pico negro *Anairetes parulus* (P)



Copete negro, cabeza oscura y líneas blancas. Dorso gris parduzco, pecho gris claro y vientre amarillento. Los juveniles presentan tonos grisáceos. Ambos sexos son iguales.

Caburé grande *Glaucidium nana* (P)




Plumaje pardo rojizo con manchas blancas visibles en pecho y alas. Cola larga, ojos y pico amarillos, ceja blanca. Suele cazar de día. Ambos sexos son iguales.

Sobrepuesto austral *Lessonia rufa* (M)



El macho es negro con la espalda castaña mientras que la hembra es de cabeza grisácea, abdomen blanco y dorso canela. Tiene una actitud solitaria y terrícola, realiza vuelos cortos sobre la costa.

Tucúquere *Bubo megallanicus* (P)



Penachos bien marcados, plumaje rayado, ojos grandes amarillos, garganta blanca y patas emplumadas. Nocturna, se ubica en silencio sobre los arboles. Ambos sexos son iguales.

Carpintero gigante *Campephilus magellanicus*




Pico recto y patas fuertes. Cuerpo negro y cabeza con cresta roja. La hembra presenta la cabeza con cresta y el cuerpo color negro, con la base del pico roja. Siendo escuchado su tamborileo a la distancia.

Cóndor andino *Vultur gryphus* (P)



Cuerpo color negro con plumas blancas superiores. Collar blanco, cabeza calva; el macho presenta cresta. La hembra ojos rojos. Su envergadura llega a los 3m, se lo observa a grandes alturas o posado sobre los cerros.

Picaflor rubí *Sephanoides sephaniodes* (P)



Dorso verde brillante, negruzcas y garganta blanca, pecho y abdomen blancuzco. El macho presenta una corona rojiza, único picaflor de la provincia.

Quetro austral *Tachyeres pteneres* (P)



Cuerpo gris, pecho blanco, patas y pico naranja con punta negra. Alas cortas con bandas laterales blancas. Ave no voladora. También llamada "pato vapor". Ambos sexos son iguales.

Espartillero austral *Asthenes anthoides* (P)



Coloración marrón parduzco con estriado en dorso y corona. De ceja clara, cola oscura y abdomen grisáceo. Ambos sexos son iguales.

Albatros ceja negra *Thalassarche melanophris*



Cuerpo blanco, dorsal negruzco. Cabeza con ceja negra visible a corta distancia, ventral del ala negruzco pico amarillo y patas rosadas. Solitario. Ambos sexos son iguales.

Cachirla goteada *Anthus correndera* (M)



Cabeza parda, pecho blanco y dorso estriado de negro con dos líneas blancas, patas rosadas con dedos largos. Ambos sexos son iguales.

Petrel gigante del sur *Macronectes giganteus*



Su envergadura es de 1,9m. Posee pico corneo. En estado juvenil, su cuerpo es negruzco Realiza vuelos en altura y rasantes en el agua. Ambos sexos son iguales.

Rayadito *Aphrastura spinicauda* (P)



Corona y lados faciales con franja negra. Garganta y pecho blanco, ceja color ocre, cola larga con prolongaciones puntiagudas. Es movedido y bullicioso. Ambos sexos son iguales.

Petrel plateado *Fulmarus glacialis* (M)



De color gris plateado. Pico con punta negra. Cabeza y cuello blanco. Sus alas son oscuras con puntas blancas. Cola gris oscura. Ambos sexos son iguales. Realiza vuelos rasantes sobre el canal.

**¿Sabías que sus picos y patas varían
según su alimentación?
OBSERVA LO VARIADA QUE ES SU DIETA**



CARNIVOROS

Se alimentan de pequeñas
aves y roedores.

CARROÑEROS

Se alimentan de restos en descom-
posición de animales muertos.



INSECTIVOROS

Se alimentan de pequeños
insectos.



LARVIVOROS

Perforan la corteza en busca de
larvas.



GRANIVOROS

Se alimentan de semillas y
granos.



RECORDÁ:

Respetar la vida silvestre y no alimentarla.

No dejar basura. Llévate siempre tus residuos.

No ingresar con mascotas: este es el hogar de muchas aves.

Si ve fauna fuera del agua, evita estresarla (camina en diagonal y no hacia ella).

Gracias por tu visita